

Alla cortese attenzione del Medico di Medicina di Base:

Gentile collega,

il suo paziente riferisce una condizione clinica per la quale consigliamo preparazioni propedeutiche alla esecuzione di TC con contrasto.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

**PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO PER PAZIENTI ALLERGICI** per prevenzione di reazione al mezzo di contrasto suggerita per:

- Pazienti allergici a mezzo di contrasto;
- Pazienti con allergie varie;
- Pazienti con allergia al latte;

1. **Deltacortene 25mg**, 2 capsule 13 ore prima dell'esame;

2. **Deltacortene 25mg**, 2 capsule 7 ore prima dell'esame;

3. **Deltacortene 25mg**, 2 capsule 2 ore prima dell'esame;

4. **Trimeton**, 1 fiala intramuscolo 1 ora prima dell'esame (in clinica Tommasini);

**PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO PER PAZIENTI AFFETTI DA INSUFFICIENZA RENALE CRONICA** per la prevenzione dell'insufficienza renale acuta:

1. **FLUIMUCIL 600mg**, 1 cp x 2 il giorno prima dell'esame;

2. **FLUIMUCIL 600mg**, 1 cp x 2 il giorno dell'esame;

**PROTOCOLLO DI TRATTAMENTO PER PAZIENTI DIABETICI** sulla base della funzionalità renale, per la prevenzione dell'insufficienza renale acuta:

- Si consiglia la sospensione della Metformina sulla base del filtrato glomerulare stimato;